Drycop® 50 DF

Fungicida y Bactericida preventivo

Capacidad 4 kg

Composición	Cobre en forma de Oxicloruro 50% p/p (500g/kg)
Formulación	(WG) Microgranulado Soluble
Nº Registro	22.209

CARACTERÍSTICAS

DRYCOP® 50 DF es un fungicida/bactericida foliar preventivo de amplio espectro y buena persistencia.

CONSEJOS GENERALES DE USO

- **Aire libre**: Pulverización normal con tractor y pulverización manual con lanza, pistola o mochila.
- **Invernadero**: Pulverización manual con lanza/pistola/mochila y con carretilla.

Aplicar el producto preventivamente dejando un periodo recomendado de 7 días entre aplicaciones, salvo en olivo que será de 18 días, adaptándolo a la evolución de la enfermedad, al tipo de cultivo y a las condiciones climáticas, siguiendo las recomendaciones de los boletines regionales de sanidad vegetal.

PREPRACIÓN DEL CALDO

Llenar el tanque con agua hasta la mitad y verter la cantidad necesaria de producto manteniendo el agitador en marcha hasta completar con el resto de agua necesaria. Aplicar la mezcla inmediatamente. Se recomienda preparar la cantidad de caldo a utilizar y no guardar el producto sobrante para posteriores aplicaciones.

Cultivo	Plaga / Efecto	Dosis	Nº Aplicaciones (intervalo)	Volumen caldo (l/ha)	P.S. (días)
Cítricos (Limón, mandarina, naranja, toronja y pomelo) Aplicar en BBCH 15-89 (desde que se hacen visibles varias hojas pero sin alcanzar su tamaño final, hasta que el fruto está maduro y óptimo para el consumo)	Aguado y bacteriosis	0,1 – 0,2% (1,5 – 2 kg/ha)	Máx. 3 (7 días)	1000-2000	14
Almendro Aplicar en pre-floración. Aplicar en BBCH 95 – 53 (desde que el 50% de las hojas están descoloradas o caídas, hasta la apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro, visibles)	Abolladura	0,15-0,40% (1,5 – 2 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	500-1000	NP
	Bacteriosis, cribado y monilia	0,3 – 0,4% (1,5 – 2 kg/ha)		500-665	
Avellano y nogal Aplicar en pre-floración. Aplicar en BBCH 95 – 53 (desde que el 50% de las hojas están descoloradas o caídas, hasta la apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro, visibles)	Bacteriosis	0,3 – 0,4% (1,5 – 2 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	500-665	NP

SIPCAM IBERIA

Pistachero Aplicar en pre-floración. Aplicar en BBCH 95 – 53 (desde que el 50% de las hojas están descoloradas o caídas, hasta la apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro, visibles)	Alternaria y bacteriosis	0,3 – 0,4% (1,5 – 2 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	500-665	NP
Frutales de pepita (Manzano, peral, membrillero, níspero y níspero del Japón) Aplicar en pre-floración. Aplicar en BBCH 91 – 53 (desde que los brotes han completado su desarrollo; yema terminal, desarrollada; follaje, completamente verde todavía, hasta apertura de las yemas: las puntas verdes de las hojas, que aún encierran las flores, visibles)	Bacteriosis y monilia	0,3 – 0,4% (1,5 – 2 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	500-665	NP
	Moteado	0,15 – 0,4% (1,5 – 2 kg/ha)		500-1000	
Frutales de hueso (Albaricoquero, cerezo, melocotón, nectarino y ciruelo) Aplicar en pre-floración. Aplicar en BBCH 95 – 53 (desde que el 50% de las hojas están descoloradas o caídas, hasta la apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas verde claro, visibles)	Abolladura	0,15 – 0,5% (1,5 – 2 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	400-1000	NP
	Bacteriosis, cribado y monilia	0,3 – 0,5% (1,5 – 2 kg/ha)		400-665	
Fresal - Aire libre e invernadero Aplicar en BBCH 13-85 (desde 3 hojas desplegadas, hasta que los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico).	Antracnosis	0,20 – 0,4% (1,5 – 1,6 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	400-800	7
Olivo Aplicar en BBCH 10-85 (desde que las primeras hojas se separan del brote, hasta que aumenta la coloración específica de los frutos).	Tuberculosis	0,33% (1,5 - 2 kg/ha)	Máx. 5 (18 días)	600	14
	Repilo	0,15 – 0,33% (1,5 – 2 kg/ha)		600-1000	
Patata - Aire libre Aplicar en BBCH 15-85 (desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada (> 4 cm), hasta bayas de la fructificación de 1er grado, de color ocre o amarronadas).	Mildiu	0,15 – 0,50% (1,5 – 2 kg/ha)	Máx. 5 (7 días)	400-1000	14
	Alternaria	0,30-0,50% (1,5 – 2 kg/ha)		400-665	
Bulbos hortícolas (Cebolla, ajo y chalote) Aplicar en BBCH 14-47 (desde que la 4ª hoja está claramente visible, hasta la inclinación del follaje: en 10% de las plantas, hojas inclinadas).	Alternaria, antracnosis y bacteriosis	0,30 – 0,50% (1,5 – 1,6 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	400-533	3
	Mildiu	0,15 – 0,50% (1,5 – 1,6 kg/ha)		400-1000	

Tomate - Aire libre e invernadero Aplicar en BBCH 15-89 (desde que la 5º hoja verdadera del tallo principal está desplegada, hasta la madurez completa).	Alternaria, antracnosis y bacteriosis	0,30 – 0,40% (Aire libre: 1,5 – 2 kg/ha) (Invernadero: 1,5 – 1,7 kg/ha (lanza, pistola o mochila) y 1,5 – 2 kg/ha (carretilla))	Máx. 5 (7 días)	Aire libre e invernadero (carretilla): 400-665 Invernadero (lanza, pistola o mochila): 400-565	10 (aire libre) 3 (invernadero)
	Mildiu	0,15 – 0,40% (Aire libre: 1,5 – 2 kg/ha) (Invernadero: 1,5 – 1,7 kg/ha (lanza, pistola o mochila) y 1,5 – 2 kg/ha (carretilla))		400-1000	
Pimiento - Aire libre e invernadero Aplicar en BBCH 15-89 (desde que la 5º hoja verdadera del tallo principal está desplegada, hasta la madurez completa). Comenzar las aplicaciones a los primeros síntomas de la enfermedad.	Antracnosis	0,24% (1,5 – 1,6 kg/ha)	Máx. 3 (7-10 días)	625-665	14
Berenjena - Aire libre e invernadero Aplicar en BBCH 15-89 (desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada, hasta la madurez completa).	Alternaria, antracnosis, bacteriosis y mildiu	0,30 – 0,40% (Aire libre: 1,5 – 2 kg/ha) (Invernadero: 1,5 – 1,7 kg pf/ha (lanza, pistola o mochila) 1,5 – 2 kg pf/ha (carretilla))	Máx. 5 (7 días)	Aire libre e invernadero (carretilla): 400-665 Invernadero (lanza, pistola o mochila): 400-565	10 (aire libre) 3 (invernadero)
Cucurbitáceas de piel comestible - Aire libre e invernadero (Pepino, calabacín y pepinillo) Aplicar en BBCH 10-89 (desde que los cotiledones están completamente desplegados, hasta la madurez completa)	Antracnosis, bacteriosis, mildiu y alternaria	0,30% (1,5 – 1,6 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	500-533	3
Cucurbitáceas de piel no comestible - Aire libre e invernadero (Melón, calabaza y sandía) Aplicar en BBCH 10-89 (desde que los cotiledones están completamente desplegados, hasta la madurez completa)	Antracnosis, bacteriosis, mildiu y alternaria	0,30 % (aire libre e invenadero (carretilla): 1,5 – 2 kg/ha) (invernadero (lanza, pistola o mochila): 1,5 – 1,7 kg/ha)	Máx. 5 (7 días)	Aire libre e invernadero (carretilla): 500-665 Invernadero (lanza, pistola o mochila): 500-565	7
Brécol y coliflor Aplicar en BBCH 14-59 (desde que la 4º hoja verdadera del tallo principal está desplegada, hasta primeros pétalos florales visibles, flores cerradas todavía).	Alternaria y mildiu	0,15 – 0,40% (1,5 – 1,6 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	400-1000	14
	Bacteriosis y antracnosis	0,30 - 0,40% (1,5 – 1,6 kg/ha)		400-533	

SIPCAM
IBERIA

Lechuga y similares - Aire libre e invernadero (Berro/mastuerzo, canónigos, lechugas, escarolas, achicoria (producción de hojas), rúcula, mostaza china, diente de león, barbareas y brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica)) Aplicar en BBCH 12-49 (desde que la 2º hoja verdadera está desplegada, hasta que se alcanza el tamaño, forma y firmeza de la cabeza típicos).	Alternaria, bacteriosis, antracnosis y mildiu	0,30 – 0,40% (1.5 – 1.6 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	400-533	7
Leguminosas verdes (frescas) – Aire libre (Judías, guisantes y lentejas) Aplicar en BBCH 14-89 (desde que la 4ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada o el 4º zarcillo desarrollado (en variedades sin hojas), hasta la madurez completa).	Bacteriosis, antracnosis y mildiu	0,30 – 0,40% (1.5 – 1.6 kg/ha)	Máx. 4 (7 días)	400-533	3
Alcachofa Aplicar en BBCH 14-51 (desde que la 4ª hoja verdadera está desplegada, hasta que la inflorescencia principal es visible).	Mildiu	0,20-0,40% (1.5 – 1.6 kg/ha)	Máx. 5 (7 días)	400-800	7
	Ascochytosis	0,15-0,40% (1.5 – 1.6 kg/ha)		400-1000	
	Alternaria y bacteriosis	0,30-0,40% (1.5 – 1.6 kg/ha)		400-533	
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmera datilera (no apto para consumo humano) y palmáceas – Aire libre e invernadero Exclusivamente para usos ornamentales. Aplicar en todos los estadios de los cultivos.	Roya	0,3 – 0,4% (Aire libre e invernadero (carretilla): 1.5 – 2 kg/ha) (Invernadero (lanza, pistola o mochila): 1.5 – 1.7 kg/ha)	Máx. 3 (7 días)	Aire libre e invernadero (carretilla): 400-665 Invernadero (lanza, pistola o mochila): 400-565	NP

- P.S.: Plazo de seguridad ; NP: No procede establecer plazo de seguridad.
- Para todos los usos autorizados: No superar la dosis máxima de 8 kg pf/ha y año y no superar la dosis máxima de 4 kg Cu/ha y año.